Lead and Nutrition

ជាតិសំណនិងចំណីអាហារ

To avoid high levels of lead in the body, it is best to eat:

ដើម្បីជៀសវាងនូវកំរិតជាតិសំណជ៍ខ្ពស់ ក្នុងរាង្គកាយ ល្អបំផុតគូរបរិភោគ +

Protein ប្រូតេអ៊ីន





Chicken សាច់មាន់

Fish សាច់ត្រី

Vitamin C ជីវិជាតិស៊ី





Mangos, oranges, lemons, tomatoes, potatoes, broccoli ផ្លែស្វាយ ផ្លែក្រូច ក្រូចឆ្នា ប៉េងជ៉េះ ដំឡូង ស្ពៃផ្កាពណ៌បៃតង

Calcium កាល់ស៊ីយូម





Bok choy, tofu, spinach, salmon ស្ពៃស តៅហ៊្យ ស្ដែន៉ិច ត្រីសាល់ម៉ឺន

Iron ជាតិដែក





Fish, meat, and dark green vegetables ត្រី សាថ់ និងបន្លែពណ៌បៃតង

Zinc ស័ង្កសី







Clams, crab, lobster, lentils, beans លាសសមុទ្រ ក្ដាម បង្កង បន្លែម្យ៉ាងដែលមានគ្រាប់ គ្រាប់សណ្ដែក

Dairy foods low in fat ចំណីអាហារធ្វើពីទឹកដោះគោមានខ្លាញ់តិច





Milk, cheese, butter, yogurt ទឹកដោះគោ ឈីហ្ស ប៊ីរ យូគ្រើត



City of Long Beach
Childhood Lead Poisoning Prevention Program
and
Lead Education and Outreach Program
English (562) 570-4203
Khmer (5620 570-4206
For Medi-Cal Information (562) 570-7979

This information is available in an alternative format by request to Michael Johnson (562) 570-4012

ព័តមាននេះអាចរកបានតាម រយះការស៊ីទៅលោក **Michael Johnson** ៥៧២) ៥៧០-៥០១២

Nutrition Helps Prevent Lead Poisoning

ចំណីអាហារជួយការពារ ជាតិសំណពុល







What is lead?

សំណគីជាអ្វី?

Lead is a soft metal found in many places in and around the home, such as:

សំណគីជាលោហធាតុទន់ម្យ៉ាងដែលគេប្រទះឃើញ មាននៅច្រើនទីកន្លែងជុំវិញផ្ទះ ដូចជា ÷

- House paint before 1978
- Dust
- លំអងធូលី
- Soil near highways and houses
- ដីក្បែរផ្លូវថ្នល់ និង ផ្ទះ
- Pewter or ceramic cookware
- សំណប៉ាហាំង ឬសម្ភារះចំអិនម្ហូបធ្វើពីសារ៉ាម៉ិច
- Toys and furniture painted before 1978
- ហ្សែងក្មេងឬតុ ទូ ដែលលាបថ្នាំមុនឆ្នាំ ១៩៧៤
- Toys, decorations, and cosmetics (makeup) made outside the U.S.
- ល្បែងក្មេង គ្រឿងតុបតែងនិងសម្ភារះសំអិត
 សំអាងកាយដែលធ្វើនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក
- Industrial parental occupations
- មុខវិជ្ជាជីវិះ ឧស្សាហ៍កម្មផ្សេងៗរបស់មាតាបិតា
- Folk remedies that are bright yellow, orange, or white powders
- Imported candies made with chilli or tamarind fruit
- ស្ករគ្រាប់នាំចូលពីក្រៅប្រទេលដែលធ្វើអំពី ដែម្តេស និងដែ អំពិល



Effects of Lead Poisoning

ផលអាក្រក់នៃសំណពុល

- Lead enters the body when children put things in their mouths or breathe lead dust.
- សំណចូលក្នុងរាង្គកាយក្មេងនៅពេលក្មេងដាក់របស់
 នានាចូលក្នុងមាត់ ឬ ដកដង្ហើមចូលល្អងធូលីដែល មានជាតិសំណ
- Lead can harm the brain, causing problems with learning, behaving, and paying attention. Damage to the brain is permanent.
- សំណអាចបំផ្លាញខូរក្បាល បង្កើនឧបសគ្គក្នុងការ សិក្សា ចរិយាមារយាទមិនប្រក្រតី ព្រមទាំង បំផ្លេចបំផ្លាញការចងចាំ ការខូចខាតផ្នែក ខូរក្បាលនិងនៅជាប់លាប់ជានិច្ចជាកាល។
- If you are pregnant, lead can hurt the baby and you.
- បើលោកអ្នកមានផ្ទៃពោះ សំណអាចបណ្ដាលអោយ រងគ្រោះដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ និងខ្លួនលោកអ្នក។

Signs and Symptoms

សញ្ញានិងរោគសញ្ញា

- Some children have no signs or symptoms of lead poisoning.
- ក្មេងខ្លះពុំមានសញ្ញាឫរោគសញ្ញាបង្ហាញ អោយដឹងថាមានជាតិសំណពុលទេ។
- Behavior and learning problems
- ចរិយាមារយាទមិនប្រក្រតី ព្រមទាំងឧបសគ្គ ក្នុងការសិក្សា
- Nausea and vomiting
- ភាពចង់ក្អួត ឬ ក្អួតចង្អោរ
- Headaches
- ឈីក្បាល
- Loss of appetite
- បាត់បង់រស់ជាតិអាហារ
- Constipation
- ទល់លាមក

